



Dieses Informationsmaterial ist für Eltern bestimmt, deren Kindern AmGlidia® verordnet wurde.

Wichtige Hinweise


- Verabreichen Sie AmGlidia® stets vor dem Füttern. AmGlidia® sollte jeden Tag zur selben Uhrzeit gegeben werden.
- Bei Milchfütterung empfiehlt es sich, die Suspension 15 Minuten vor dem Füttern des Kindes anzuwenden.
- Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- Nach Anbruch innerhalb von 30 Tagen verwenden. Die Flasche fest verschlossen halten.
- Bitte lesen Sie stets die Packungsbeilage, bevor Sie AmGlidia® verabreichen.

Dosierungsanweisung

Wichtige Informationen zur Medikamenteneinnahme für Sie im Überblick. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Arzt.

1 ml-Spritze 

5 ml-Spritze 



Klinikstempel



0,6 mg/ml & 6 mg/ml

Suspension zum
Einnehmen

AMG-DE-V001_04/2021_005

Einmalige Vorbereitung:

Öffnen Sie die Flasche, setzen Sie den Adapter ein und drehen dann den Schraubdeckel wieder fest zu.

Nun ist der Adapter für alle Anwendungen gut in der Flasche befestigt.

1



Öffnen Sie die Flasche, indem Sie den Verschluss gleichzeitig nach unten drücken und aufdrehen.

2

Spritze aufsetzen


Halten Sie die Flasche aufrecht und führen die Spritze fest in den Adapter ein.



Drehen Sie die Flasche anschließend über Kopf.


3

Ziehen Sie die Spritze ungefähr bis zum gewünschten Volumen auf und drücken anschließend den Kolben wieder zurück.



Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls, bis keine Luftblasen mehr zu erkennen sind.

4



Ziehen Sie den Kolben bis zu der Markierung zurück, die der verschriebenen Dosis in ml entspricht.

5

Nehmen Sie Ihr Kind in halbsitzender Position, so dass der Kopf des Kindes auf Ihrem Arm aufliegt.

Führen Sie die Spritze ca. 1 cm weit in den Mund und an das Innere der Wange. Wenn das Kind nicht selbst saugt, geben Sie ihm die Suspension langsam ein.



Legen Sie das Kind möglichst erst wieder hin, nachdem es das Arzneimittel geschluckt hat.



Verabreichen Sie AmGlidia® stets vor dem Füttern.

AmGlidia® sollte jeden Tag zur selben Uhrzeit gegeben werden.

6



Spülen Sie die Spritze nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und trocknen sie ab.

Legen Sie die Spritze zurück in den AmGlidia®-Karton.